



Exemple de questionnaire d'accueil incluant la prise de médication,
la consommation de SPA et le risque de sevrage
pouvant être administré par une infirmière¹

Date d'arrivée		No de chambre	
Prénom		Nom	
Date de naissance (jj/mm/aaaa)			
Numéro assurance maladie (NAM)			

Grossesse et menstruations

Date des dernières menstruations : _____
Test de grossesse urinaire fait : Non Oui _____
Date prévue accouchement : _____
Nombre de semaines de grossesse : _____

Informations sur la médication

La personne a-t-elle besoin de prendre des médicaments ? En faire la liste et noter avec quelle pharmacie elle fait affaire.	
A-t-elle assez de médication pour 72 heures ? Sinon il faut contacter la pharmacie et demander la livraison d'une quantité suffisante pour 72 heures.	
Est-elle sur un programme de traitement par agonistes opioïdes (p. ex. méthadone, suboxone ^{MC} , Kadian ^{MC}) ? Si oui, vous aurez besoin des informations pour organiser les livraisons de la pharmacie qui peuvent devoir être journalières. ²	

¹ Questionnaire adapté de celui développé par l'équipe de l'unité d'isolement du Royal Victoria du CIUSSS CCSMTL. Toutefois, il pourrait être ajusté pour du personnel non-infirmier.

² Note : Depuis le 19 mars 2020, vu le contexte exceptionnel de pandémie de la COVID-19, des exemptions ont été accordées par Santé Canada. Jusqu'à nouvel ordre, le pharmacien est autorisé à modifier l'ordonnance pour permettre des doses non supervisées aux patients ainsi qu'à transférer l'ordonnance à l'intérieur d'une même province (voir [Exemption](#) et [Foire aux questions](#)).



Profil de consommation d'alcool

Nombre d'années d'utilisation	Type d'alcool habituellement consommé (dernier mois)	Fréquence d'utilisation (dernier mois)	Quantité quotidienne moyenne (dernier mois)	Dernière consommation (date, heure et quantité)

Informations sur la consommation actuelle de substances psychoactives (SPA) autres que l'alcool

Substances psychoactives	SPA habituellement consommée (O/N)	Voie d'administration (plus fréquente)	Fréquence d'utilisation (dernier mois)	Quantité quotidienne moyenne (dernier mois)	Dernière consommation (date, heure et quantité)
Benzodiazépines					
Héroïne					
Opioides					
Cocaïne, crack					
Amphétamines et autres stimulants					
GHB, Kétamine					
Barbituriques					
Cannabis					
Tabac					
Autre(s) : _____					

Risques de sevrage d'alcool

1— Facteurs généraux	OUI	NON
Âge: plus de 60 ans		
I.M.C : moins de 17		
Personne enceinte		
Alcool et Benzo		
Alcool et opioïdes		
Alcool et GHB-Kétamine		
Alcool et Cannabis-Stimulants-Autres substances		
Alcool impropre à la consommation (Méthanol, Listerine*, Purell*, Aqua Velva, etc.)		



2- Quantité de consommations sur 24 h	Cocher (un choix)	
Moins de 15 consommations		
De 16 à 20 consommations		
De 21 à 30 consommations		
De 31 à 40 consommations		
Plus de 40 consommations		
3- Mode de consommation sur 24 heures	OUI	NON
Je peux rester 8 heures sans consommer		
Je peux rester entre 4 et 8 heures sans consommer		
Je dois consommer au minimum toutes les 4 heures		
4- Facteurs d'aggravation de sevrage	OUI	NON
Antécédents de convulsions de sevrage dans les 6 derniers mois		
Antécédents de delirium tremens dans les 6 derniers mois		
Antécédents de convulsions avec traitement de Benzo		
Antécédent de traumatisme crânien		
Antécédent d'épilepsie		
Antécédents de maladie hépatique		
Antécédents de maladie cardiaque		
Antécédents de diabète		
Présence de troubles cognitifs		

Une attention particulière devrait être portée aux personnes présentant des risques importants liés au sevrage à savoir :

- Antécédents de delirium tremens
- Antécédents de convulsions de sevrage
- Usage de benzodiazépine ou de gamma-hydroxybutyrate (GHB)
- Symptômes de sevrage survenant tôt après la dernière consommation
- Hospitalisation pour un problème médical ou chirurgical
- Présence d'une atteinte cérébrale structurale
- Déshydratation, troubles électrolytiques, thrombocytopénie

En présence de risques de complications liées au sevrage d'alcool, envisager la possibilité de diriger la personne vers un centre de réadaptation en dépendance ou un centre hospitalier, ou se référer à une équipe spécialisée en dépendance.