

**Clinique Relais**

Hôpital Notre Dame  
1560, Sherbrooke Est  
Pavillon Lachapelle, 3ème SS. Local TS 3340  
Montréal, (PQ) H2L 4M1  
Téléphone : (514) 413-8777  
Télécopieur : (514) 847-0601

Destinataire Pharmacie : \_\_\_\_\_

Fax : \_\_\_\_\_

Bonjour,

Cette lettre vous est envoyée aujourd'hui à titre informatif. Aucune préparation n'est requise de votre part dans l'immédiat.

Votre patient, ##### nom du patient RAMQ ABCD 1234 5678 #####, fait maintenant partie d'un protocole de traitement aux agonistes opioïdes injectables (TAOi). Le médicament utilisé est l'hydromorphone injectable à une concentration de 50 mg/ml. Il est préparé en seringues préremplies par les pharmaciens de l'hôpital Notre-Dame et auto-administré quotidiennement à la clinique Relais sous supervision.

Votre patient débutera un TAOi le :

Le traitement est dispensé dans le cadre des services offerts à la clinique Relais du CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. Un nombre réduit de patients a été identifié comme étant éligible à un traitement injectable compte tenu de leur difficulté à adhérer aux traitements conventionnels. Ce traitement s'inscrit dans l'application des mesures de réduction des méfaits en réponse à la crise des opioïdes qui frappe les personnes utilisatrices de drogues injectables au Canada. L'objectif étant de favoriser la rétention en traitement et de diminuer les risques d'infections ou de décès liés à la consommation de substances psychoactives illicites.

Les patients se présentent à la clinique deux fois par jour pour s'auto-administrer l'hydromorphone IV à hautes doses. Le patient reçoit également une dose de médicament per os, soit la méthadone ou le Kadian<sup>MC</sup>, pour éviter les états de manque durant la nuit. Une prescription vous sera acheminée pour que vous serviez la dose de méthadone ou de Kadian<sup>MC</sup> en coprescription.

La **fin de semaine et les jours fériés**, comme la clinique sera fermée et l'auto-injection impossible, une conversion complète en TAO oral sera prescrite. Une prescription vous sera acheminée avec un dosage plus élevé pour que vous serviez la dose de méthadone ou de Kadian<sup>MC</sup> en remplacement.

Vous recevrez, d'ici quelques jours, un appel d'un professionnel de la clinique qui vous expliquera en quoi consiste le projet et quel est votre rôle en tant que pharmacien communautaire.

Nous vous demandons de :

- Laisser une note apparente dans le dossier de votre patient
- Aviser vos équipes
- Inscrire à votre dossier pharmacie (en attente) l'information suivante afin que l'injectable d'hydromorphe soit visible au DSQ :

**Hydromorphe injectable 50 mg/ml fioles de 50 ml (DIN 02469413 Sterimax)**  
**\*NE PAS SERVIR\* Auto-injections IV BID-TID (+ méthadone/morphine-24h PO die hs)**

**Coordonnées : Clinique Relais, 1560 rue Sherbrooke E, Montréal (Québec)**  
**Hôpital Notre-Dame, 3eSS Pavillon Lachapelle**  
**(514) 413-8777 # 28113 ou #28109**

- Si impossible, entrer l'hydromorphe injectable dans la catégorie médicament de référence (MRF) ou dans divers (8888) (n'apparaît pas au DSQ)
- Indiquer en commentaires dans les lignes de la posologie de l'ordonnance valide de méthadone ou de Kadian<sup>MC</sup>: *sous traitement par hydromorphe IV contacter la clinique Relais (514) 413-8777 # 28113 ou #28109*

Pour toute demande médicale en lien avec votre patient, prière de contacter le médecin en charge au numéro suivant : \_\_\_\_\_.

Pour toute autre question, nous vous invitons à communiquer directement avec l'équipe traitante à la clinique Relais du CIUSSS Centre-Sud de l'Île-de-Montréal :

Clinique Relais  
Hôpital Notre Dame  
1560, Sherbrooke Est  
Pavillon Lachapelle, 3ème SS. Local TS 3340  
Montréal, (PQ) H2L 4M1  
(514) 413-8777 # 28113 ou #28109

En vous remerciant de votre précieuse collaboration, je vous prie d'accepter mes sincères salutations,

Nicole Merrizi  
Cheffe de service à la Clinique Relais  
Direction des programmes santé mentale et dépendance  
CIUSSS Centre-Sud de l'Île de Montréal

## Références pertinentes

1. Perreault M. Goyer M-E. et al. Guide d'information et d'orientation pour une offre de traitement par agonistes opioïdes injectable au Québec. Institut universitaire sur les dépendances (IUD) du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal en collaboration avec le Centre de recherche de l'Hôpital Douglas. 2019. Disponible sur : [https://etudetaoi.files.wordpress.com/2020/03/centre-de-recherche-hd\\_guide-dinformation-version-finale.pdf](https://etudetaoi.files.wordpress.com/2020/03/centre-de-recherche-hd_guide-dinformation-version-finale.pdf)
2. <https://taoinjectable.com/>
3. Initiative canadienne de recherche sur l'abus de substances (ICRAS). Lignes directrices cliniques nationales pour le traitement par agonistes opioïdes injectables du trouble lié à l'usage d'opioïdes. Publié le 23 septembre 2019. Disponible sur : <https://crism.ca/projects/ioat-guideline/>
4. British Columbia Centre on substance use. Guidance for Injectable Opioid Agonist Treatment for Opioid Use Disorder. Disponible sur: <https://www.bccsu.ca/wp-content/uploads/2017/10/BC-iOAT-Guidelines-10.2017.pdf>
5. Sandoz Canada. Prescribing information : opioid agonist. Révision du 30 avril 2019. Disponible sur : [https://www.sandoz.ca/sites/www.sandoz.ca/files/Hydromorphone%20HP%20Product%20Monograph\\_0.pdf](https://www.sandoz.ca/sites/www.sandoz.ca/files/Hydromorphone%20HP%20Product%20Monograph_0.pdf)