



Résumé des étapes lors de l'induction de buprénorphine injectable à libération prolongée (Sublocade^{MC})

AVANT LE DÉBUT DU TRAITEMENT

- Vérifier les contre-indications et les interactions médicamenteuses.
- Confirmer le plan de traitement.
- S'assurer de la disponibilité du médicament à la pharmacie de la personne.
- Compléter la formation sur l'administration du Sublocade^{MC}.
- Envoyer une copie de la certification avec l'ordonnance à la pharmacie communautaire de la personne.
- Compléter la demande auprès de la RAMQ.
- S'assurer du consentement libre et éclairé de la personne (présenter l'outil « Faire un choix éclairé de sa molécule en TAO »).

JOUR DE L'INJECTION

Avant l'administration du médicament

- Sortir le médicament et appliquer de la glace sur le site d'injection 15 minutes avant l'injection.
- Ouvrir l'emballage devant la personne. Si la personne a elle-même apporté son médicament, s'assurer que les modalités de conservation ont été respectées.
- Changer l'aiguille 19G pour une aiguille 20G si cela semble cliniquement préférable.
- Demander à la personne dans quelle position elle souhaite se placer.
- Informer la personne que l'injection doit se faire lentement et est un peu douloureuse.



Après l'administration du médicament

- Expliquer à la personne que le dépôt ne doit pas être manipulé et qu'il disparaît 2 mois environ après l'injection.
- Rappeler les effets secondaires à surveiller, dont les complications au site d'injection et les symptômes de sevrage.
- Convenir des modalités de suivi avec la personne, dont un appel dans les premiers jours suivant l'injection.
- Planifier la date de l'injection suivante et en informer la pharmacie.