

POUR JOINDRE LES MEMBRES DE L'ÉQUIPE DE SOINS PARTENAIRE :



L'Équipe de soutien
clinique et organisationnel
en dépendance et itinérance

CLINIQUE:



ESPACE POUR Y METTRE QUESTIONS OU INFORMATIONS

Substances fréquemment prescrites pour soulager la douleur, qui peuvent aussi causer de l'euphorie. A forte dose elles peuvent engendrer une surdose via une dépression ou un arrêt respiratoire.

LES OPIOÏDES, QU'EST-CE QUE C'EST ?



On dit qu'une personne a une dépendance lorsqu'elle consomme d'opioïdes, qu'ils soient prescrits ou illlicites, entraîne d'importantes conséquences sur sa capacité à fonctionner, sur sa qualité de vie ou lorsqu'il fait de ne pas consommer d'opioïdes lui fait ressentir des symptômes de manque (sevrage). On appelle aussi cette dépendance le trouble lié à l'utilisation d'opioïdes.

QU'EST-CE QUE LA DÉPENDANCE AUX OPIOÏDES ?

Le traitement consiste à prendre un médicament de façon régulière pour éliminer les symptômes de sevrage, l'enivie de consommer et diminuer les risques de surdose. On l'appelle le traitement par agonistes opioïdes (TAO). Il existe plusieurs médicaments pour traiter le TAO. Les plus connus sont la méthadone, la buprénorphine-naloxone (Suboxone®) et la morphine à libération lente unidoulatrice (Kadian®). Ces deux fois par mois sous forme d'injection.

Le choix dépend des besoins et réalisés de chaque personne. Il est important de savoir qu'il est possible de changer de médicament en cours de traitement.



EXISTE-T-IL DES TRAITEMENTS POUR LE PROBLÈME LIÉ À L'UTILISATION D'OPIOÏDES (TAO) ?

Oui

**FAIRE UN CHOIX ÉCLAIRÉ : TABLEAU COMPARATIF
DES DIFFÉRENTS TRAITEMENTS PAR AGONISTES OPIOÏDES (TAO)**

Facteurs à considérer dans le choix d'un traitement	Méthadone	Buprénorphine-Naloxone orale (Suboxone ^{MC})	Buprénorphine injectable à libération prolongée (Sublocade ^{MC})	Morphine à libération lente unquotidienne (Kadian ^{MC})
Forme du médicament	Liquide mélangé avec du jus, disponible en comprimés pour des cas précis.	Comprimé ou film à prendre par la bouche.	Injection sur l'abdomen faite en clinique.	Capsule avec de petites granules à avaler ou ouverte dans une compote ou de l'eau.
Prise du médicament	Quotidienne	Quotidienne ou une fois à tous les deux ou trois jours	Mensuelle	Quotidienne
Délai pour atteindre une dose de confort	Rapidité du dosage: - Augmentation hebdomadaire.	Rapidité du dosage: ++ 24 à 48 h (induction standard avec sevrage). 7 à 14 jours (microdosage sans sevrage).	Rapidité du dosage: ++ La personne doit être stabilisée préalablement sur buprénorphine-naloxone orale à une dose entre 8 et 24 mg.	Rapidité du dosage: +/- Augmentation tous les deux jours pour atteindre la dose de confort.
Usage d'opioïdes pendant le traitement	Option à considérer pour poursuivre l'usage d'opioïdes en plus du traitement.	Option à considérer pour cesser complètement l'usage d'opioïdes.	Option à considérer pour cesser complètement l'usage d'opioïdes.	Option à considérer pour poursuivre l'usage d'opioïdes en plus du traitement.
Fréquence des visites à la pharmacie	En début de traitement, le médicament est pris sous supervision du pharmacien tous les jours . Des doses non supervisées peuvent être accordées au cas par cas.	Des doses non supervisées peuvent être accordées pour un maximum d'un mois , et ce dès le début du traitement.	Chaque mois , l'injection est faite en clinique (sans frais associé à l'injection) ou en pharmacie (avec des frais associés à l'injection faite par l'infirmière).	La prise est quotidienne en pharmacie. Des doses non supervisées peuvent être accordées au cas par cas.
Fréquence et intensité des effets secondaires les plus souvent observés en plus de ceux présents pour tous les opioïdes*	Fréquents, intensité élevée Possibilité de: troubles sexuels (difficulté érectile, baisse de testostérone, absence des menstruations, etc.), prise de poids, démangeaisons.	Peu fréquents, intensité faible Mal de tête dans les premières semaines du traitement.	Peu fréquents, intensité faible Surveiller l'apparition d'effets secondaires au site d'injection (rougeur, gonflement, infection, etc.).	Peu fréquents, intensité faible

* Effets secondaires pour tous les opioïdes : constipation, maux de tête, fréquents en début de traitement, étourdissements, envie de vomir (nausées) et vomissements, mal au ventre, transpiration plus forte, envie de dormir (somnolence).

QUELLE EST LA DUREE DU TRAITEMENT (TAO)?



APPROVISIONNEMENT PLUS SECURITAIRE (SAFER SUPPLY)

Cette équipe interdisciplinaire est disponible pour accompagner la personne dans son traitement. Elle peut être composée d'un médecin, d'une infirmière, d'un intervenant psychosocial, d'un pair-aide et d'un pharmacien communautaire. Certaines comparent ce traitement à celui d'une maladie chronique qui peuvent demander des changements (ex. : écoute, accompagnement, démarches, logement, revenu).

La durée recommandée d'un TAO varie en fonction des circonstances et des besoins particuliers de chaque personne, mais est habituellement sur le long terme. Il peut y avoir des hauts et des bas, mais en général, si le traitement est bien suivi, la prise des activités du quotidien est possible et simplifiée. Certains comparent ce traitement à celui d'une maladie chronique qui peuvent établir une routine de vie.

Lorsqu'une personne commence un traitement, un soutien psychosocial est offert et encouragé. Ce soutien adapté permet d'avoir de l'aide pour réorganiser certaines facettes de la vie quotidienne qui peuvent demander des changements (ex. : écoute, accompagnement, démarches, logement, revenu). Securitaire est une pratique qui vise à remplacer les opioïdes qui sont achetés sur le marché illégale par des opioïdes prescrits. Cela peut être fait en début de traitement, lorsque la dose de confort de TAO n'est pas encore atteinte pour diminuer les symptômes de sevrage, ou en cours de traitement afin d'éviter que une personne ne se procure des opioïdes illégaux, ou en cours de traitement afin d'éviter que une personne ne se soins partenaire, c'est peut-être une option à envisager.

Qu'une personne soit en traitement ou pas, il est important de toujours avoir de la naloxone. Ses proches doivent également savoir de toujours avoir de la naloxone, l'antidote en cas de surdose d'opioïdes. Ses membres de l'équipe sont en mesure de remettre gratuitement leur ensemble de naloxone pour sauver des vies!

La naloxone, antidote des opioïdes



QUI SONT LES MEMBRES DE L'ÉQUIPE DE SOINS PARTENAIRES?

Il est important de noter que les membres de l'équipe servent en mesure d'analyser avec la personne les meilleures options en prenant en considération les différents aspects de sa situation (santé physique, organisation de vie, interaction avec d'autres médicaments, etc.).

Qui sont les effets secondaires qui sont acceptables ou non pour vous ?

Comment la prise du médicament peut-elle être intégrée à votre routine quotidienne, en fonction de votre horaire de travail, de vos responsabilités familiales, de la proximité de la pharmacie, de votre capacité à vous déplacer ?

Quels sont vos autres conditions médicales ou antécédents médicaux ?

Prévoyez-vous poursuivre votre consommation d'opioïdes durant le traitement ?

Pour répondre à cette question, il est important de bien identifier ses besoins et d'en discuter avec l'équipe de soins partenaire.

Comment choisir le mieux à ses besoins ?

Elle peut être composée d'un médecin, d'une infirmière, d'un intervenant psychosocial, d'un pair-aide et d'un pharmacien communautaire. En fonction des besoins de la personne, l'équipe peut aider à réduire ou aggraver. L'équipe est là pour renseigner, soutenir la personne dans ses différentes démarches et ajuster le traitement.

Qui convient le mieux à ses besoins ?

Est-ce que vous avez déjà essayé certains traitements ?

Quels sont les effets secondaires qui sont acceptables ou non pour vous ?

Quels sont vos autres conditions médicales ou antécédents médicaux ?

Comment la prise du médicament peut-elle être intégrée à votre routine quotidienne, en fonction de votre horaire de travail, de vos responsabilités familiales, de la proximité de la pharmacie, de votre capacité à vous déplacer ?

Quels sont les effets secondaires qui sont acceptables ou non pour vous ?